第 8 講　気体の性質

Step 1

1　次の各問いに答えなさい。

(1)　石灰石にうすい塩酸を加えると発生する気体の物質名は何か。

(2)　水素を発生させる方法を，次のア～エからすべて選べ。

ア　塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱する。

イ　炭酸水素ナトリウムにうすい塩酸を加える。

ウ　亜鉛にうすい塩酸を加える。

エ　水を電気分解する。

(3)　二酸化マンガンに加えると酸素が発生するものを，次のア～エから１つ選べ。

ア　水酸化カルシウム　　イ　オキシドール　　ウ　うすい塩酸　　エ　石灰水

(4)　酸素を集める方法として最も適しているものを，次のア～オから１つ選べ。



(5)　表は，二酸化炭素，水素，酸素，塩素，アンモニアのいずれかの性質を示している。気体 A～E の物質名をそれぞれ書け。

	空気の重さを１としたときの重さ	色	におい	水への溶け方
気体 A	0.07	なし	なし	溶けにくい
気体 B	2.48	黄緑色	刺激臭	溶けやすい
気体 C	1.53	なし	なし	少し溶ける
気体 D	1.11	なし	なし	溶けにくい
気体 E	0.60	なし	刺激臭	非常に溶けやすい

©RECRUIT HOLDINGS
本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は著作権者に帰属します。
また本サービスに掲載の全部または一部につき無断複製･転載を禁止します。

Step　2

2　気体の性質について，次の(1)～(3)の問いに答えなさい。

(1)　図１のように，試験管Ａで二酸化炭素を発生させ，試験管Ｂに水上置換で集めた。

図１



①　次のア～エのうち，試験管Ａに入れた水溶液Ｘはどれか，１つ選んで記号を書きなさい。

ア　砂糖水

イ　うすい塩酸

ウ　うすい水酸化ナトリウム水溶液

エ　オキシドール（うすい過酸化水素水）

②　図１で，ガラス管からはじめに出てくる気体は集めずに，しばらくしてから出てくる気体を集めた。その理由を「**はじめに出てくる気体には**」に続けて書きなさい。

③　試験管Ｂに集めた気体が二酸化炭素であることを，次のように確かめた。（　Ｙ　）に当てはまる液体の名称を書きなさい。

試験管Ｂに（　Ｙ　）を加えてふると，（　Ｙ　）が白くにごった。

(2)　図２のように，アンモニアを集めた試験管を，水が入った容器に入れ，ゴム栓をとったところ，図３のように，試験管の中に水が吸いこまれた。このことから，アンモニアにはどのような性質があると言えるか，書きなさい。

図２　図３



©RECRUIT HOLDINGS
本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は著作権者に帰属します。
また本サービスに掲載の全部または一部につき無断複製･転載を禁止します。

(3)　気体の体積の割合が異なるときのものの燃え方を調べるために，次の実験を行った。

【実験】　図４のように，窒素(ちっそ)と酸素の体積の比がおよそ１：１になるように混合した気体の入った試験管Ｃと，空気の入った試験管Ｄを用意し，それぞれの試験管に火のついた線香を入れた。表は，そのときの結果を示したものである。また，図５は，空気中の気体の体積の割合を示したものである。

図４



表

試験管	線香の燃え方
C	入れる前より激しくなった
D	入れる前と同じであった

図５



①　窒素の化学式を書きなさい。

②　試験管Ｃに入れた線香の燃え方が，表のようになったのはなぜか。図５をもとに，混合した気体と空気のちがいを示して書きなさい。

【秋田県】

©RECRUIT HOLDINGS
本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は著作権者に帰属します。
また本サービスに掲載の全部または一部につき無断複製･転載を禁止します。

Step　3

3　気体A～Eの性質を調べるために，下の実験1～3を行った。次の(1)～(4)に答えなさい。ただし，A～Eは，水素，窒素，酸素，二酸化炭素，アンモニアのいずれかであるものとする。

> 実験1　A～Eを別々に1種類ずつ取った注射器に，それぞれ少量の水を入れ，密閉(みっぺい)してよくふったところ，A，Bを取った注射器のピストンが移動して，A，Bの体積が減少したことがわかった。
>
> 実験2　A～Eを別々に1種類ずつ取った試験管に，それぞれ水で湿らせた青色リトマス紙を入れたところ，Aに入れたものだけが赤色に変化した。
>
> 実験3　C～Eを別々に1種類ずつ取った試験管を用意し，C，Dの中にそれぞれ火のついた線香を入れたところ，Cでは炎を上げたが，Dでは火が消えた。Eに［　　　］。このことから，Eが水素であることがわかった。

(1)　実験1について，下線部の理由を書きなさい。

(2)　実験1，2の結果から，Aの名称を書きなさい。

(3)　実験3について，次のア，イに答えなさい。

ア　Cのつくり方として最も適切なものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を書きなさい。

1　細かく切ったジャガイモをオキシドールに入れる。
2　スチールウールを塩酸に入れる。
3　ベーキングパウダーを酢に入れる。
4　硫化鉄を塩酸に入れる。

イ　実験3の［　　　］に，Eが水素であることを明らかにするための方法とその結果を書きなさい。

©RECRUIT HOLDINGS
本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は著作権者に帰属します。
また本サービスに掲載の全部または一部につき無断複製･転載を禁止します。

(4)　下の表は，実験 1～3 で用いた気体について，20 ℃における $1000cm^3$ の質量をそれぞれ示したものである。次のア，イに答えなさい。

	水素	窒素	酸素	二酸化炭素	アンモニア
$1000cm^3$ の質量（g）	0.08	1.16	1.33	1.84	0.72

ア　下の文は，表に示した気体のいずれかについて述べたものである。文中の［ ① ］に入る化学式，［ ② ］に入る適切な語を，表と実験 1～3 の結果からそれぞれ書きなさい。

表の気体の中で，$1000cm^3$ の質量が 2 番目に小さい気体の化学式は［ ① ］であり，この気体の集め方は，［ ② ］置換法が適している。

イ　20 ℃における空気 $1000cm^3$ の質量は表の値を用いると何 g か。答えは小数第三位を四捨五入して求めなさい。ただし，空気は窒素と酸素の気体が，体積の比 4：1 で混ざり合っているものとする。

【青森県】

©RECRUIT HOLDINGS
本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は著作権者に帰属します。
また本サービスに掲載の全部または一部につき無断複製･転載を禁止します。

〈 ***Note*** 〉

©RECRUIT HOLDINGS
本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は著作権者に帰属します。
また本サービスに掲載の全部または一部につき無断複製･転載を禁止します。

第 8 講　気体の性質

Step 1

1 (1) 二酸化炭素　(2) ウ・エ　(3) イ　(4) ウ　(5) A．水素　B．塩素　C．二酸化炭素　D．酸素　E．アンモニア

Step 2

2 (1) ① イ　② (はじめに出てくる気体には) 試験管 A の中にあった空気が多くふくまれているから。(同意可)　③ 石灰水　(2) 水に非常にとけやすい性質。(同意可)
(3) ① N_2　② 混合した気体のほうが，空気よりも酸素の割合が大きいから。(同意可)

Step 3

3 (1) 気体 A，B が水に溶けたから。(同意可)　(2) 二酸化炭素　(3) ア．1　イ．火を近づけるとポンと音がした (同意可)　(4) ア．① NH_3　② 上方　イ．1.19 (g)

©RECRUIT HOLDINGS
本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は著作権者に帰属します。
また本サービスに掲載の全部または一部につき無断複製･転載を禁止します。